

Fischarten der Würm

systematisch (Fischfamilien)	Bemerkung	berücksichtigen?	Verbreitung (in der Würm)
Forellenartige Salmoniden			
Bachforelle			Würm häufig
Äsche			aus der Würm verschwunden
Regenbogenforelle			Würm verbreitet
Karpfenfische Cypriniden			
Karpfen			Würm vereinzelt (mittlere & obere Würm, Schwippe)
<i>Schleie</i>			Einzelfunde (obere Würm & Schwippe)
<i>Rotfeder</i>			Einzelfunde (vor allem obere Würm & Schwippe)
Rotauge			Würm verbreitet
Brachsen			Würm vereinzelt (mittlere & obere Würm r)
<i>Güster</i>			Einzelfunde (obere Würm)
<i>Karassche</i>			Einzelfund e Würm
<i>Giebel</i>			Einzelfunde (S)
Döbel			Würm häufig
Hasel			unterste Würm
Barbe			untere/mittlere Würm
Gründling			Würm ohne Oberläufe
Nase			Einzelfund (Schwippe)
Schneider			Mittlere und untere Würm
Strömer			selten und geschützt; FFH-Art Würmmündung
Laube, Ukelei			Einzelfunde Würmmündung
Elritze			Würm verbreitet
Barschartige Perciden			
Flussbarsch			Würm vereinzelt (vor allem mittlere Würm)
<i>Zander</i>			In Würm vereinzelt
Sonstige			
Schmerle			gesamte Würm häufig
Europäischer Aal			Obere Würm und Schwippe: Einzelfunde
Groppe			Würm häufig;
Quappe			Einzelfund (obere Würm l)
Hecht			Würm vereinzelt
Dreistachliger Stichling	Feinsedimente!!!		Würm verbreitet (ohne untere Würm)
Blaubandbärbling			Rankbach (Einzelfund)